




# NOCIONS BÀSIQUES DE PODA I FORMES DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA

# PODA: tipus de brots i forma correcte de tallar








**B. Cutting a small branch**




**C. Cutting a larger branch**




# PODA DE FORMACIÓ




1. Cortes de «refaldado».







## Formació d'un arbret a partir d'un arbust



# PODA D'ACLARIMENT



*Poda de chupones y tallos viejos de una lila.*

# ELS ARBRES FRUITERS

Algunes consideracions sobre la poda i la fructificació. Per a més informació: [www.infoagro.com](http://www.infoagro.com) i [www.infojardin.com](http://www.infojardin.com)

## Cirerer

- Fruiter de fulla caduca. Poda de formació durant 3 anys.
- Es pot fer una poda d'aclariment i manteniment per regular l'excés de branques després de la fructificació.
- Escorça molt sensible, si es malmet pot produir la mort de la branca.
- Floreix i fructifica al final del hivern sobre fusta de 2-3 anys, a partir de 6-8 anys de vida.
- És bàsicament autoestèril i per tant necessitarà company de pol·linització.

## Magraner

- Fruiter de fulla caduca i port petit força apte per ser cultivat en recipient.
- Poda de formació durant 2 o 3 anys, després de manteniment per alleugerir-lo de branques.
- Floreix en branques noves, el maig-juliol, i es recol·lecta a finals d'estiu.
- És autofèril.

## Codonyer

- Fruiter caducifoli i port petit força apte per ser cultivat en recipient
- Poda de formació durant 2 o 3 anys, després poda de manteniment molt lleugera. És un arbret de poca vigorositat.
- Floreix a principis de la primavera sobre fusta de 2-3 anys, per tant tardarà uns anys en produir
- És autofèril

## Albercoquer

- Fruiter caducifoli de port mig
- Fer una poda de formació i fer una poda regular de rejuveniment cada 3-4 anys deixant els brots bastant curts
- Floreix i fructifica al final del hivern, és sensible a les gelades, tant sobre brots nous o de fins a 2-3 anys. Cal regar abundantment.
- És autofèril

## Presseguer

- Fruiter caducifoli que requereix una adequada poda de formació
- Requereix una poda més complexa anomenada de fructificació que cal realitzar cada any.
- Cal diferenciar entre diferents tipus de brots: llenyosos (només amb borrons que donen fulla), els fructífers falsos (només tenen botons florals) i els fructífers veritables (amb fulles i botons florals).
- Cal potenciar el brots amb fulla i fruit deixant 6-8 borrons (poda llarga)
- Escurçar a 3-5 borrons els llenyosos i a 1-2 borrons els que porten només flor, també podem eliminar totalment aquets brots florals.
- És autofèril

## Cítrics

- Fruiters de fulla perenne de port petit-mitjà
- Fer una adequada poda de formació i una poda molt lleugera de manteniment a finals d'hivern.
- Al cap d'uns anys es pot fer una poda de rejuveniment més severa.


## Nesprer

- Arbre fruiter de port petit de fulla perenne força adequat per cultiu en recipient
- No necessita poda de formació ni de manteniment.
- És autofèril


## Pruner

- Fruiter de fulla caduca port mitjà-gran.
- Fer poda de formació
- Fer una poda regular per limitar el creixement que es pot fer tant al hivern com a l'estiu (poda en verd).
- Acostumen a ser autofèrils


# LA REPRODUCCIÓ VEGETATIVA



**ESQUEIX**



**DIVISIÓ DE MATA**



**PER ESTOLÓ**