

MASTEGATATXES

"Ficedula hypoleuca"

El **mastegatatxes** o també anomenat en castellà **papamoscas cerrojillo**, és un ocell d'una longitud de 13 cm. El mascle, en període nupcial, és de color blanc i negre amb les parts superiors negres, la front, la franja alar i les parts inferiors són blanques. La femella és de color gris a la part de dalt i blanquinós a la part inferior.



Detall de la taca blanca a la front.



Mastegatatxes mascle amb un insecte al bec.

El seu tipus d'hàbitat són boscos caducifolis (rouredes, fagedes) i mixtes, passos de mitjanes fluvials, zones muntanyenques entre els 1.200 i 1.800 metres d'altitud. La seva migració es realitza entre els mesos d'agost i octubre. Nidifica durant els mesos de maig a juny i realitza una sola posta anual formada per 4 o 7 ous.

Costums del Mastegatatxes...

Quan el mastegatatxes roman posat té la costum d'eixir-se a la vegada que sacseja amb freqüència les ales i la cua.

S'alimenta d'insectes, escarabats voladors i en ocasions de cucs. Roman entre les branques dels arbres a la espera de localitzar algun insecte i realitza vols curts per a caçar l'aliment.

Estat de protecció...

Segons el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades, el mastegatatxes és una espècie catalogada d'**interès especial**. Aquest catàleg extreu del conjunt de les espècies protegides, aquelles que requereixen mesures específiques de protecció i les inclou en quatre categories diferents: en perill d'extinció, sensibles a l'alteració del seu hàbitat, vulnerables i d'interès especial.

A la Mitjana...

Podreu observar aquest ocell entre finals d'estiu i principis de tardor.



Ajuntament de Lleida

**Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.**

Categoría de amenaza

Categoría: **De Interés Especial**

Fecha: 5 de abril de 1990

Norma: Real Decreto 439/1990

- Mundial: Su área reproductiva abarca el noroeste de África, suroeste y centro de Europa hasta el límite de los bosques en Escandinavia, llegando por el este hasta Siberia occidental. Raro en el área mediterránea, cría localmente en el sur de Francia, Iberia y el Magreb.

- España: Nidificante repartido por casi toda la Península, aunque falta en áreas discontinuas. Cría, al menos, en la Cornisa Cantábrica, Pirineos, Sistemas Ibérico y Central, así como en la C. Valenciana. Muy común en migración por toda la Península, especialmente en el norte; mínima cantidad de invernantes. No cría en Baleares ni en Canarias, donde sólo aparece en paso, relativamente abundante en Baleares y poco abundante en Canarias.

Tamaño de la población.

Evolución

Población nidificante estimada entre 13.000 y 35.000 parejas. Existen pocos datos locales sobre su densidad: 3 aves/10 ha en pinares maduros de *P. sylvestris* en el Macizo de Ayllón (1985) y 2,3 en pinares supramediterráneos de *P. pinaster* en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos (1991). En Salamanca, 0,3 aves/10 ha. Todos estos niveles aumentan si se le proporciona nidos artificiales, como se ha demostrado en La Hiruela (Madrid) donde se pasó de 2 a 18 machos territoriales en una parcela de 15 ha en cinco años (1984-89) (1990). Muy común en migración en casi todo el país. Considerada como No amenazada en España, no se dispone de datos para evaluar su tendencia. En la mayoría de los países europeos sus poblaciones se han incrementado, incluidas las de Suecia y Finlandia, donde cría cerca de la mitad del contingente europeo.

Factores de amenaza Sobre la especie:

- Caza por pajareros, especialmente en migración.

Sobre el hábitat:

- Destrucción y transformación del hábitat de los nidificantes.
- Disminución de bosques de altura y fragmentación del hábitat.

**Medidas de conservación
específicas**

Propuestas Conservación del hábitat, especialmente de nidificación.

- Control de la caza ilegal.
- Colocación de nidos artificiales en bosques y frutales que tengan árboles sin huecos, manteniendo un control y mantenimiento adecuados de las cajas.